



CMC-B[®]



ĐUBRIVO NA BAZI BORA KOJE POSPEŠUJE RAST I RAZVOJ BILJAKA I POMAŽE IM U ODBRANI OD INSEKATA

Bor (B) vodorastvorljivi: 2% • Biljni ekstrakti 70%

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

CMC-B je đubrivo na bazi bora koje pospešuje rast i razvoj biljaka i pomaže biljkama u odbrani od insekata. Takođe spira mednu rosu koja se nalazi na biljkama.

CMC-B može se koristiti u svim vrstama voća, povrća i ratarskih kultura kao i u zaštićenom prostoru.

DOZIRANJE I PRIMENA:

CMC-B se koristi u rastvoru 200-300 ml/100 l vode, ili 3 l/ha sa maks. 1000 litara vode. Preporučljivo je obaviti tretman u hladnijem delu dana i dobro prekriti rastvorom vegetativnu masu, ali bez slivanja rastvora. **CMC-B** se može koristiti u organskoj poljoprivredi u skladu sa regulativom CE 834/2007 i 889/2008.

ZAŠTO CMC-B

- ✓ Preparat poseduje brzu kontaktnu aktivnost
- ✓ Širok spektar delovanja
- ✓ Visoka efikasnost u pomoći biljkama na kontrolu larvi i odraslih jedinki Psile, bele leptiraste vaši, voćnog pauka, raznih oblika stenica, lešnikovog surlaša i uholeža
- ✓ Uklanja mednu rosu i gljivu čađavicu
- ✓ Brzo se razgrađuje i ne ostavlja ostatke
- ✓ Idealan za integralne i biološke programe
- ✓ referentni proizvod za tretmane neposredno pre berbe
- ✓ Nema karencu
- ✓ Može se koristiti i u post-harvest tretmanima i tokom mirovanja vegetacije
- ✓ Ne zagađuje okolinu
- ✓ Proizvod deluje brzo i pokazuje punu efikasnost u roku od nekoliko sati

NAČIN DELOVANJA

CMC-B ima brz kontaktni efekat i visoku efikasnost u svim fazama razvoja. **CMC-B** suši i uklanja mednu rosu koje proizvodi Psila, biljne vaši, štitaste vaši sa lišća i plodova, kao i gljivu čađavicu.

VREME PRIMENE

Primenu započeti kada se pojave potreba za Borom ili potreba za pomoć biljkama protiv napada insekata. Kasniji tretmani se vrše nakon 7-15 dana. Doza upotrebe je od 2 do 4 l / ha, u zavisnosti od sorti, sa upotrebom od maksimalno 1000 litara vode po hektaru, kako bi se obezbedilo ravnomerno nanošenje bez slivanja suvišnog rastvora. **CMC-B** se takođe može koristiti u tretmanima sa manjim količinama vode, uvek poštujući dozu upotrebe po hektaru. Preparat se ne koristi u cvetanju i neposredno nakon cvetanja na mladim delovima biljaka.

MEŠANJE PREPARATA

Preparat se ne meša sa proizvodima na bazi bakra, folijarnim đubrivima koja sadrže Ca, Mg, Fe, helatima, aktivnim materijama kao što su hlortalonil i fosetil Al. Ovi preparati se mogu primeniti pre, ali nikada nakon primene preparata **CMC-B**. Tretman se može ponoviti nakon 7 dana.

CMC-B se može mešati sa aktivnim materijama kao što su: Abamectine, Chlorpirifos, Carpocapsa granulovirus, Emamectine, Captan, TMTD, Ziram, Tebuconazol.

Preparat poseduje visoku otpornost na ispiranje, ima visoku prionljivost na prskane površine stoga mu nije potreban okvašivač.

OGRANIČENJA U PRIMENI

- ⚠ Neke sorte krastavca su osetljive na preparat u toku cvetanja. (preporučuju se preliminarni testovi sa kontrolom održavanja cvetova)
- ⚠ Na kupusnjačama izaziva promenu boje listova zbog reakcije s voskom na površini lista
- ⚠ Na nekim sortama jagoda, zelene salate (u dozi od 250ml/hl) uzrokuje promene boje listova
- ⚠ Budite pažljivi na nektarinama i šljivama
- ⚠ Breskve su otpornije od nektarina
- ⚠ Ne koristite na višnjama
- ⚠ Preparat se ne sme koristiti u fazi cvetanja i odmah nakon cvetanja
- ⚠ Mladi listovi su osetljivi na preparat

Dostupno u pakovanjima od 0,25, 1 i 10ℓ.

Saveti o primeni preparata: Voćarstvo, ratarstvo: Miroslav Marković, 063.432.141 • Povrtarstvo: Aleksandra Đurđević, 063.433.169

